

PROTOCOLE D'URGENCE

à renseigner par le médecin qui suit l'enfant

Protocole destiné à la mise en œuvre de traitements d'urgence par des personnels non soignants sur le temps scolaire, périscolaire ou extra-scolaire.

COMPOSITION DE LA TROUSSE D'URGENCE (à cocher)	
<input type="checkbox"/> SOLUPRED <i>Prednisolone</i> <input type="checkbox"/> 5mg <input type="checkbox"/> 10mg <input type="checkbox"/> 20mg Ou <input type="checkbox"/> CÉLESTENE <i>Bétaméthasone</i> 0.05% gouttes	<input type="checkbox"/> VENTOLINE Spray <i>Salbutamol</i> <input type="checkbox"/> AIROMIR Spray <i>Salbutamol</i> <input type="checkbox"/> AUTRES : • Chambre d'inhalation (<i>cocher la case concernée</i>) : <input type="checkbox"/> avec masque <input type="checkbox"/> avec embout buccal

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CRISE

Signes d'appel	Conduite à tenir
<p>En cas d'apparition d'un des signes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gêne respiratoire • Essoufflement • Oppression thoracique • Sifflements audibles • Pincement des narines <p>Signes d'aggravation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difficultés pour parler • Pâleur • Lèvres bleues (cyanose) <p>Traitement de fond de l'enfant : </p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mettre en position assise, au calme, le/la rassurer. ➤ Noter l'heure de début de la crise <p>Donner le traitement :</p> <p><input type="checkbox"/> VENTOLINE Spray <input type="checkbox"/> AIROMIR Spray</p> <p><input type="checkbox"/> AUTRES : Dose :</p> <p><input type="checkbox"/> SOLUPRED <input type="checkbox"/> CÉLESTENE Dose :</p> <p>Si les signes persistent après minutes, renouveler la ventoline ou l'airomir uniquement avec les même doses.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Appeler le centre 15 (112) et suivre leurs recommandations ➤ Prévenir la famille

Date :

Cachet et signature du médecin qui suit l'enfant :

Conseils d'utilisation d'une chambre d'inhalation

1. Retirer le capuchon du spray
2. Secouer le spray
3. Vérifier que la chambre ne contient aucun corps étranger
4. Tenir le spray verticalement, embout vers le bas et l'adapter sur la chambre
5. Déclencher le spray (**une dose à la fois**) dans la chambre en position horizontale
6. **Compter 10 inspirations/expirations** en maintenant une bonne étanchéité entre le masque et la bouche
7. Déclencher une seconde fois le spray et compter 10 inspirations/expirations
8. Répéter l'opération autant de fois que de bouffées prescrites